

# Carvedilol STADA® 25 mg Tabletten

Wirkstoff: Carvedilol

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

**Diese Packungsbeilage beinhaltet:**

1. Was ist Carvedilol STADA® und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Carvedilol STADA® beachten?
3. Wie ist Carvedilol STADA® einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Carvedilol STADA® aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

**1. Was ist Carvedilol STADA® und wofür wird es angewendet?**

Carvedilol STADA® gehört zu einer als Betablocker bezeichneten Gruppe von Arzneimitteln. Sie wirken, indem sie Ihre Blutgefäße erweitern und dadurch einen zu schnellen Herzschlag verhindern.

**Carvedilol STADA® wird angewendet**

- zur Behandlung des Bluthochdrucks (essentielle Hypertonie)
- zur Behandlung der chronisch stabilen Angina pectoris (Schmerzen in der Brust aufgrund einer Minderdurchblutung des Herzmuskels, auch als koronare Herzkrankheit bezeichnet)
- in Kombination mit anderen Arzneimitteln zur Behandlung der mittelschweren bis schweren chronisch stabilen Herzinsuffizienz (Herzmuskelschwäche). Eine mittelschwere bis schwere Herzinsuffizienz liegt vor, wenn Ihr Herz nicht ausreichend gut arbeitet und dadurch bestimmte Beschwerden auftreten, wie z.B.
  - Schwellungen im Bereich der Knöchel
  - Atemnot.

**2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Carvedilol STADA® beachten?****Carvedilol STADA® darf NICHT eingenommen werden**

Sie dürfen Carvedilol STADA® nicht einnehmen

- wenn Sie **überempfindlich** (allergisch) gegen **Carvedilol** oder **einen der sonstigen Bestandteile** von Carvedilol STADA® sind (siehe Abschnitt 6 am Ende dieser Gebrauchsinformation)
- wenn Sie an einer **schweren Herzmuskelschwäche** leiden, die mit intravenös (direkt in eine Vene) verabreichten Arzneimitteln behandelt werden muss
- wenn Sie an **Bronchialasthma** leiden
- wenn Sie an einer **schweren chronisch obstruktiven Lungenerkrankung** leiden, bei der es zu einer Verengung der Atemwege und Atemnot kommt
- wenn Sie an einer **schweren Lebererkrankung** leiden, die medizinische Überwachung erfordert
- wenn Sie an einem **Herzblock** (einer Störung der Reizleitung im Herzen) oder am so genannten **Sick-Sinus-Syndrom** leiden
- wenn Sie einen **sehr langsamen Herzschlag** (Bradykardie) mit weniger als 50 Schlägen pro Minute haben
- wenn bei Ihnen ein **kardiogener Schock** vorliegt (ein sehr niedriger Blutdruck aufgrund eines Herzversagens)
- wenn Ihr **Blutdruck sehr niedrig** ist (systolischer/oberer Blutdruckwert unter 85 mmHg)
- wenn Sie an **metabolischer Azidose** leiden (Übersäuerung des Blutes, etwa wenn der Blutzucker bei Diabetikern zu stark ansteigt)
- wenn Ihnen **Verapamil** oder **Diltiazem** direkt in eine Vene gespritzt werden muss.

**Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Carvedilol STADA® ist erforderlich**

Bitte informieren Sie Ihren Arzt, wenn einer der nachfolgend genannten Umstände bzw. eine der genannten Erkrankungen derzeit bei Ihnen vorliegt oder wenn dies früher einmal der Fall war:

- **Herzinsuffizienz** (wenn das Herz nicht genügend Blut für den Bedarf des Körpers pumpen kann, was zu Symptomen wie Schwellungen im Bereich der Knöchel oder Atemnot führt)
- **Eingeschränkte Nierenfunktion**
- Ein kürzlich erlittener **Herzinfarkt** und eine dadurch bedingte **Herzinsuffizienz**
- **Chronisch obstruktive Lungenerkrankung** – Ihre medikamentöse Behandlung muss möglicherweise angepasst werden
- **Diabetes (Zuckerkrankheit)** – Ihre medikamentöse Behandlung muss möglicherweise angepasst und die Symptome eines zu niedrigen Blutzuckers können verschleiert werden
- **Durchblutungsstörungen in Ihren Gliedmaßen** (kalte Finger oder Füße)
- **Raynaud-Syndrom** (schmerzende Finger oder Zehen, die sich zuerst bläulich, dann weißlich und schließlich rötlich verfärben)
- **Überfunktion der Schilddrüse** (Hyperthyreose oder Thyreotoxikose)
- Eine bevorstehende **Narkose** oder **große Operation**
- **Verlangsamte Herzschlagfolge** (weniger als 55 Herzschläge pro Minute)
- **Niedriger Blutdruck bei aufrechter Haltung**, der zu Schwindelgefühl oder Ohnmacht führen kann (orthostatische Hypotonie)
- Ein **leichter Herzblock** (I. Grades)
- Eine **entzündliche Herzerkrankung**
- **Probleme mit Ihren Herzklappen**
- **Verengung der großen Körperschlagader (Aorta)**
- **Bluthochdruck** verursacht durch eine andere Erkrankung (sekundäre Hypertonie)
- **Schwere Überempfindlichkeitsreaktionen** (Allergien) in der Vergangenheit oder wenn Sie eine **Hyposensibilisierungstherapie** gegen bestimmte Allergieauslöser erhalten
- **Schuppenflechte (Psoriasis)** – da sich deren Symptome verschlimmern können
- Wenn Sie **Diltiazem, Verapamil** oder andere **Arzneimittel zur Kontrolle des Herzrhythmus** anwenden (siehe auch unter Abschnitt 2: Bei Einnahme von Carvedilol STADA® mit anderen Arzneimitteln)
- **Phäochromozytom** (ein Tumor, der einen plötzlichen Blutdruckanstieg verursachen kann)
- **Wenn Sie Kontaktlinsen tragen** – Carvedilol kann den Tränenfluss vermindern und zu trockenen Augen führen.

Die Behandlung mit Carvedilol STADA® darf nicht abrupt abgesetzt werden. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie an koronarer Herzkrankheit (Minderversorgung des Herzmuskels mit Blut) leiden.

**Auswirkungen bei Fehlgebrauch zu Dopingzwecken**

Die Anwendung von Carvedilol STADA® kann bei Dopingkontrollen zu positiven Ergebnissen führen. Die gesundheitlichen Folgen der Anwendung von Carvedilol STADA® als Dopingmittel können nicht abgesehen werden, schwerwiegende Gesundheitsgefährdungen sind nicht auszuschließen.

**Bei Einnahme von Carvedilol STADA® mit anderen Arzneimitteln**

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Seien Sie besonders vorsichtig und informieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie eines der nachfolgend genannten Arzneimittel anwenden:

- **Amiodaron** oder **andere Arzneimittel zur Kontrolle des Herzrhythmus**
- **Digoxin** oder **Digitoxin** (Arzneimittel zur Behandlung der Herzmuskelschwäche)
- **Diltiazem** oder **Verapamil** (Arzneimittel zur Behandlung von Bluthochdruck und Herzproblemen)
- **Amlodipin, Felodipin, Nifedipin** und **ähnliche Calciumkanalblocker** (Arzneimittel gegen Bluthochdruck)
- **Andere Arzneimittel gegen Bluthochdruck**
- **Insulin** oder **Tabletten zur Behandlung von Diabetes**
- **Rifampicin, Erythromycin, Clarithromycin** oder **Telithromycin** (Antibiotika)
- **Cimetidin** (Arzneimittel gegen Sodbrennen und Magengeschwüre)
- **Ketoconazol** (Arzneimittel gegen Pilzinfektionen)
- **Fluoxetin** (Arzneimittel gegen depressive Erkrankungen)
- **Haloperidol** (Arzneimittel gegen psychotische Erkrankungen)
- **Reserpin, Guanethidin, Methylidopa** oder **Guanfacin** (so genannte zentral wirksame Arzneimittel gegen Bluthochdruck)
- **Clonidin** (Arzneimittel für viele seltene Erkrankungen/Behandlungen)
- **Moclobemid** oder **Phenelzin** (so genannte Monoaminoxidasehemmer, Arzneimittel gegen depressive Erkrankungen)
- **Ciclosporin** (Arzneimittel zur Unterdrückung des Immunsystems des Körpers)
- **Ergotamin** (Arzneimittel gegen Migräne oder zu niedrigen Blutdruck)
- **Nitrate** (Arzneimittel gegen Angina pectoris)
- Arzneimittel zur Behandlung von geistig-seelischen Erkrankungen (**Phenothiazine**), Depression (**tricyclische Antidepressiva**) oder Epilepsie (**Barbiturate**)
- **Nichtsteroidale entzündungshemmende Schmerzmittel** (so genannte NSAR)
- **Kortison-Präparate**, die eingenommen oder als Spritze verabreicht werden
- **Östrogen-Präparate** (weibliche Geschlechtshormone)
- **Arzneimittel gegen allergische Reaktionen** (Adrenalin) – ihre Wirkung kann vermindert werden.

Informieren Sie Ihren Arzt über die Einnahme von Carvedilol STADA®, wenn Sie sich einer **Narkose** oder **Operation** unterziehen müssen.

**Bei Einnahme von Carvedilol STADA® zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken**

Carvedilol STADA® kann die Wirkungen von Alkohol verstärken. Während der Anwendung von Carvedilol STADA® sollten Sie daher möglichst keinen Alkohol trinken.

**Schwangerschaft und Stillzeit**

Fragen Sie vor der Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Die Anwendung von Carvedilol STADA® während der Schwangerschaft wird nicht empfohlen. Wenn Sie während der Behandlung mit diesem Arzneimittel schwanger werden, müssen Sie dies sofort Ihrem Arzt mitteilen.

Stillende Mütter sollen Carvedilol STADA® nicht anwenden.

**Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen**

Carvedilol STADA® kann Nebenwirkungen verursachen (siehe Abschnitt 4: Welche Nebenwirkungen sind möglich?), die Ihre Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen können, wie Schwindel, Ohnmacht, Kopfschmerzen oder Schwächegefühl. Wenn solche Nebenwirkungen auftreten, sollten Sie sich nicht an das Steuer eines Fahrzeugs setzen und auch andere Tätigkeiten unterlassen, die Aufmerksamkeit und Koordination erfordern. Am wahrscheinlichsten sind solche Nebenwirkungen zu Behandlungsbeginn oder nach einer Dosiserhöhung von Carvedilol STADA®.

**Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Carvedilol STADA®**

Dieses Arzneimittel enthält Lactose und Sucrose. Bitte nehmen Sie Carvedilol STADA® daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

**3. Wie ist Carvedilol STADA® einzunehmen?**

Nehmen Sie Carvedilol STADA® immer genau nach der Anweisung des Arztes ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Nehmen Sie die Tabletten oder Tablettenhälften im Ganzen mit einer ausreichenden Menge Flüssigkeit (z.B. 1 Glas Wasser) ein. Sie dürfen die Tabletten nicht zerkauen. Die Tabletten können während einer Mahlzeit oder auf nüchternen Magen eingenommen werden.

**Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:****Bluthochdruck (Hypertonie)**

Carvedilol STADA® kann zur Behandlung des Bluthochdrucks entweder allein oder in Kombination mit anderen Arzneimitteln angewendet werden. Die Tabletten können 1-mal täglich eingenommen werden.

**Erwachsene**

Die empfohlene Anfangsdosis beträgt 1-mal täglich 12,5 mg Carvedilol an den ersten beiden Behandlungstagen. Danach ist die Behandlung mit einer Dosierung von 1-mal täglich 25 mg Carvedilol fortzusetzen. Falls erforderlich kann der Arzt die Dosis in Abständen von mindestens 2 Wochen erhöhen. Die höchste empfohlene Einzeldosis beträgt 25 mg Carvedilol. Die empfohlene Tageshöchstosis beträgt 50 mg Carvedilol.

**Ältere Menschen**

Die empfohlene Anfangsdosis beträgt 1-mal täglich 12,5 mg Carvedilol. Diese Dosis kann zur Blutdruckeinstellung bereits ausreichend sein. Falls erforderlich kann der Arzt die Dosis in Abständen von mindestens 2 Wochen erhöhen.

**Chronisch stabile Angina pectoris (Koronare Herzkrankheit)**

Die Tabletten sollten 2-mal täglich eingenommen werden.

**Erwachsene**

Die Anfangsdosis beträgt 2-mal täglich 12,5 mg Carvedilol an den ersten beiden Behandlungstagen. Danach ist die Behandlung mit einer Dosierung von 2-mal täglich 25 mg Carvedilol fortzusetzen. Falls erforderlich kann der Arzt die Dosis in Abständen von mindestens 2 Wochen erhöhen. Die empfohlene Höchstosis beträgt 100 mg Carvedilol täglich und ist in 2 Einzelgaben zu je 50 mg Carvedilol einzunehmen.

**Ältere Menschen**

Die empfohlene Anfangsdosis beträgt 2-mal täglich 12,5 mg Carvedilol an den ersten beiden Behandlungstagen. Danach ist die Behandlung mit einer Dosierung von 2-mal täglich 25 mg Carvedilol, der empfohlenen Höchstosis, fortzusetzen.

## Herzmuskelschwäche

Wenn Sie an einer Herzmuskelschwäche leiden, die nach den Befunden der vom Arzt durchgeführten Untersuchungen als mittelschwer bis schwer eingestuft wurde, kann Ihnen Carvedilol STADA® zusätzlich zu Ihren anderen Arzneimitteln verordnet werden.

Die Behandlung wird in einer Dosierung von 2-mal täglich 3,125 mg Carvedilol in den ersten beiden Behandlungswochen begonnen. Wenn Sie diese Dosierung mindestens 2 Wochen lang gut vertragen haben, wird sie auf 2-mal täglich 6,25 mg Carvedilol gesteigert. Weitere Dosissteigerungen erfolgen in Abhängigkeit von der individuellen Verträglichkeit und in Abständen von mindestens 2 Wochen. Die Höchstdosis hängt von Ihrem Körpergewicht ab. Bei einem Körpergewicht unter 85 kg beträgt die Höchstdosis 2-mal täglich 25 mg Carvedilol. Bei einem Körpergewicht über 85 kg beträgt die Höchstdosis 2-mal täglich 50 mg Carvedilol.

Die Symptome Ihrer Herzmuskelschwäche können sich zu Behandlungsbeginn oder bei einer Dosiserhöhung vorübergehend verschlechtern, insbesondere wenn Sie an schwerer Herzmuskelschwäche leiden und Diuretika (harntreibende Arzneimittel) in hohen Dosen anwenden. Dies bedeutet nicht, dass Sie die Behandlung absetzen müssen. In diesem Fall wird Ihr Arzt die Dosierung Ihrer anderen Arzneimittel gegebenenfalls anpassen.

Sie müssen Ihren Arzt unbedingt informieren, wenn Sie eine sehr langsame Herzschlagfolge (weniger als 50 Schläge pro Minute) bei sich bemerken. Die Dosierung von Carvedilol STADA® bzw. die Dosierung Ihrer anderen Arzneimittel muss dann gegebenenfalls von Ihrem Arzt angepasst werden.

Wenn Sie die Behandlung mit Carvedilol STADA® einmal länger als 2 Wochen unterbrechen müssen, dann muss eine erneute Behandlung wieder mit der niedrigsten (Anfangs-) Dosis begonnen werden. Diese kann dann wie zuvor schrittweise gesteigert werden.

## Patienten mit eingeschränkter Nieren- oder Leberfunktion

Eine Dosisanpassung kann erforderlich sein. Ihr Arzt wird Ihnen sagen, welche Dosis einzunehmen ist.

## Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren

Aufgrund mangelnder Erfahrung bei diesen Patienten wird die Anwendung von Carvedilol STADA® bei Kindern und Jugendlichen nicht empfohlen.

## Ältere Menschen

Der Arzt wird Sie engmaschiger überwachen, da Sie auf die Wirkungen von Carvedilol STADA® unter Umständen empfindlicher reagieren.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Carvedilol STADA® zu stark oder zu schwach ist.

## Wenn Sie eine größere Menge Carvedilol STADA® eingenommen haben, als Sie sollten

Wenden Sie sich sofort an Ihren Arzt oder suchen Sie die Notaufnahme des nächstgelegenen Krankenhauses auf. Bringen Sie die Packung, diese Gebrauchsinformation sowie alle übrig gebliebenen Tabletten mit.

Nach einer Überdosierung kann es zu folgenden Beschwerden kommen:

- starker Blutdruckabfall
- stark verlangsamte Herzschlagfolge
- Herzmuskelschwäche
- Atembeschwerden
- Bewusstseinsverlust
- Erbrechen
- Krämpfe.

## Wenn Sie die Einnahme von Carvedilol STADA® vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben. Setzen Sie die Behandlung wie verordnet fort.

## Wenn Sie die Einnahme von Carvedilol STADA® abbrechen

Setzen Sie die Behandlung mit Carvedilol STADA® nur auf ärztliche Anweisung ab. Wenn Sie die Einnahme abrupt beenden, können sich die Symptome Ihrer Erkrankung verschlechtern. Ihr Arzt wird Sie anweisen, wie die Dosierung zuerst zu vermindern und Carvedilol STADA® schließlich ganz abzusetzen ist.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

## 4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann Carvedilol STADA® Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

Sehr häufig:	mehr als 1 Behandler von 10
Häufig:	1 bis 10 Behandelte von 100
Gelegentlich:	1 bis 10 Behandelte von 1 000
Selten:	1 bis 10 Behandelte von 10 000
Sehr selten:	weniger als 1 Behandler von 10 000
Nicht bekannt:	Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

### Sehr häufig:

- Schwindel, Kopfschmerzen
- Verschlechterung einer Herzmuskelschwäche (Kurzatmigkeit, Schwellungen im Bereich der Knöchel)
- Niedriger Blutdruck
- Müdigkeit.

### Häufig:

- Bronchitis, Lungenentzündung, Atemwegsinfektionen, Harnwegsinfektionen
- Gewichtszunahme, Anstieg des Cholesterinspiegels im Blut, beeinträchtigte Glukose-Toleranz, Anstieg oder Abfall des Blutzuckerspiegels (bei Diabetikern), Anämie (Abfall der Zahl der roten Blutkörperchen)
- Depression, depressive Verstimmung
- Sehstörungen, verringerter Tränenfluss (trockene Augen), Augenreizungen
- verlangsamter Herzschlag, Ödeme (Schwellung eines Organs oder Gewebes aufgrund einer Ansammlung von Gewebeflüssigkeit), Flüssigkeitsüberlastung des Körpers, niedriger Blutdruck bei aufrechter Haltung (orthostatische Hypotonie)
- Durchblutungsstörungen in den Gliedmaßen (kalte Finger oder Füße, Claudicatio intermittens)
- Raynaud-Syndrom (schmerzende Finger oder Zehen, die sich zuerst rötlich, dann bläulich und schließlich weißlich verfärben)
- Atembeschwerden (Dyspnoe), Lungenödem (Flüssigkeitseinlagerung in der Lunge), Verschlechterung von Asthma-Symptomen
- Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Sodbrennen, Magenschmerzen
- Schmerzen in den Armen und Beinen, allgemeine Schmerzen
- Nierenfunktionsstörungen und Nierenversagen, Probleme beim Wasserlassen.

### Gelegentlich:

- Schlafstörungen
- Benommenheit, Ohnmacht, Kribbeln in den Gliedmaßen (Parästhesien)
- Herzblock, Schmerzen im Brustkorb (Angina pectoris)
- Allergische Hautreaktionen: Hautausschlag, Nesselsucht (Urtikaria), Juckreiz
- Schuppenflechte (Psoriasis), Schuppenflechte-ähnliche Hautreaktionen
- Haarausfall
- Potenzstörungen.

### Selten:

- Abnahme der Zahl der Blutplättchen (kann zu leichtem Auftreten von Blutergüssen und Nasenbluten führen)
- Verstopfte Nase
- Gewichtsverlust/Anorexie
- Abnahme der Muskelmasse.

### Sehr selten:

- Abnahme der Zahl der weißen Blutkörperchen (kann zu Symptomen von Infektionen, ungeklärtem Fieber, rauem Hals führen)
- Überempfindlichkeitsreaktionen (Allergien)
- Anstieg der Leberenzyme im Blut (ALAT, ASAT, GGT)
- unwillkürlicher Harnabgang (Inkontinenz) bei Frauen.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

## 5. Wie ist Carvedilol STADA® aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Faltschachtel und der Durchdrückpackung angegebenen Verfallsdatum nicht mehr anwenden. Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Arzneimittel sollten nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Apotheker wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr benötigen. Diese Maßnahme hilft die Umwelt zu schützen.

## 6. Weitere Informationen

### Was Carvedilol STADA® enthält

Der Wirkstoff ist: Carvedilol.

1 Tablette enthält 25 mg Carvedilol.

Carvedilol STADA® ist in verschiedenen Wirkstärken erhältlich.

### Die sonstigen Bestandteile sind

Crospovidon, Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat (Ph.Eur.), Povidon K 25, hochdisperses Siliciumdioxid, Sucrose.

### Wie Carvedilol STADA® aussieht und Inhalt der Packung

Weiß, runde, bikonvexe Tablette mit einseitiger Bruchkerbe.

Carvedilol STADA® ist in Packungen mit 28 (N1), 30 (N1), 50 und 100 (N3)Tabletten erhältlich.

### Pharmazeutischer Unternehmer

STADAPharm GmbH, Stadastraße 2–18, 61118 Bad Vilbel  
Telefon: 06101 603-0, Telefax: 06101 603-259, Internet: www.stada.de

### Hersteller

STADA Arzneimittel AG, Stadastraße 2–18, 61118 Bad Vilbel

Dieses Arzneimittel ist in den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) unter den folgenden Bezeichnungen zugelassen:

Belgien:	Carvedilol EG 25 mg tabletten
Bulgarien:	Carvedilol EG 25 mg
Dänemark:	Carvedilol „PCD“ 25 mg tablets
Estland:	Cardiostad 25 mg tablets
Finnland:	Carvedilol STADA® 25 mg
Großbritannien:	Carvedilol 25 mg tablets
Italien:	Carvedilol 25 mg tablets
Lettland:	Cardiostad 25 mg tablets
Litauen:	Cardiostad 25 mg tablets
Luxemburg:	Carvedilol EG 25 mg
Norwegen:	Carvedilol STADA® tablettler 25 mg
Österreich:	Carvedilol „STADA®“ 25 Tabletten
Portugal:	Carvedilol Ciclum 25 mg comprimidos
Rumänien:	Carvedilol STADA® 25 mg
Schweden:	Carvedilol STADA® 25 mg tablets

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im November 2010.