

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese dieselben Symptome haben wie Sie.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

## **Diese Packungsbeilage beinhaltet:**

1. Was ist Urtimed® 10 mg Tabletten und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Urtimed® 10 mg Tabletten beachten?
3. Wie ist Urtimed® 10 mg Tabletten einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Urtimed® 10 mg Tabletten aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

### **1. WAS IST URTIMED 10 mg TABLETTE UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?**

Urtimed 10 mg Tabletten ist ein Antihistaminikum. Urtimed 10 mg Tabletten lindert die Symptome eines allergischen Schnupfens wie z. B. Niesen, laufende Nase, Juckreiz an Augen und Nase.

Urtimed 10 mg Tabletten wird auch angewendet, um die Symptome einer Urtikaria (allergischer Hautausschlag, Nesselsucht) zu lindern, wie z. B. Juckreiz und Quaddeln (stellenweise Rötung und Schwellungen auf der Haut).

### **2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON URTIMED 10 mg TABLETTE BEACHTEN?**

**Urtimed 10 mg Tabletten darf nicht eingenommen werden,**

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Rupatadin oder einen der sonstigen Bestandteile von Urtimed 10 mg Tabletten sind.

#### **Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Urtimed 10 mg Tabletten**

Wenn Sie eine eingeschränkte Nieren- oder Leberfunktion haben, fragen Sie Ihren Arzt um Rat. Für Patienten mit einer eingeschränkten Nieren- oder Leberfunktion wird die Anwendung von Urtimed 10 mg Tabletten zurzeit nicht empfohlen.

Kinder unter 12 Jahren dürfen dieses Arzneimittel nicht einnehmen.

Wenn Sie älter als 65 Jahre sind, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

#### **Einnahme von anderen Arzneimitteln**

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen oder vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Nehmen Sie keine Arzneimittel, die Ketoconazol oder Erythromycin enthalten, wenn Sie Urtimed 10 mg Tabletten einnehmen.

### **Bei Einnahme von Urtimed 10 mg Tabletten zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken**

**Urtimed 10 mg Tabletten darf nicht zusammen mit Grapefruitsaft eingenommen werden, da dadurch die Konzentration von Rupatadin im Körper ansteigen kann.**

#### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Nehmen Sie während Schwangerschaft und Stillzeit Urtimed 10 mg-Tabletten nicht ein, außer wenn Ihr Arzt es Ihnen ausdrücklich verordnet hat.

Fragen Sie vor der Einnahme von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

#### **Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen**

In der empfohlenen Dosierung wird Urtimed 10 mg Tabletten voraussichtlich keinen Einfluss auf Ihre Fahrtüchtigkeit oder Fähigkeit, Maschinen zu bedienen, haben. Sie sollten aber vorsichtig mit der Einnahme von Urtimed 10 mg Tabletten beginnen und darauf achten, wie die Behandlung sich bei Ihnen auswirkt, bevor Sie ein Fahrzeug führen oder Maschinen bedienen.

#### **Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Urtimed 10 mg Tabletten**

Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Wenn Ihnen einmal von einem Arzt mitgeteilt wurde, dass Sie bestimmte Zucker nicht vertragen, informieren Sie Ihren Arzt darüber, bevor Sie dieses Arzneimittel einnehmen.

### **3. WIE IST URTIMED 10 mg TABLETTE EINZUNEHMEN?**

Nehmen Sie Urtimed 10 mg Tabletten immer genau nach Anweisung des Arztes ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Urtimed 10 mg Tabletten ist ein Arzneimittel für Jugendliche (ab 12 Jahren) und Erwachsene. Die übliche Dosis ist eine Tablette (10 mg Rupatadin) einmal täglich mit oder ohne Nahrungsmittel. Schlucken Sie die Tablette mit genügend Flüssigkeit (z. B. einem Glas Wasser).

Ihr Arzt wird Ihnen sagen, wie lange Sie die Behandlung mit Urtimed 10 mg Tabletten fortsetzen sollen.

#### **Wenn Sie eine größere Menge von Urtimed 10 mg Tabletten eingenommen haben, als Sie sollten:**

Wenn Sie versehentlich eine Überdosis von Ihrem



Arzneimittel eingenommen haben, sprechen Sie unverzüglich mit Ihrem Arzt oder Apotheker.

**Wenn Sie die Einnahme von Urtimed 10 mg Tabletten vergessen haben:**

Nehmen Sie Ihre Dosis so bald wie möglich ein und setzen Sie die Einnahme Ihrer Tabletten anschließend zu den üblichen Zeiten fort. Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

**4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

Wie alle Arzneimittel kann Urtimed 10 mg Tabletten Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem Behandelten auftreten müssen.

Häufige Nebenwirkungen (bei weniger als 1 von 10, aber mehr als 1 von 100 Patienten) sind Schläfrigkeit, Kopfschmerzen, Schwindel, Mundtrockenheit, ein Gefühl von Schwäche und Erschöpfung.

Gelegentliche Nebenwirkungen (bei weniger als 1 von 100, aber mehr als 1 von 1.000 Patienten) sind gesteigerter Appetit, Reizbarkeit, Konzentrationschwierigkeiten, Nasenbluten, trockene Nase, Halsschmerzen, Husten, trockener Rachen, Schnupfen, Übelkeit, Bauchschmerzen, Durchfall, Verdauungsstörungen, Erbrechen, Verstopfung, Hautausschlag, Rückenschmerzen, Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen, Durst, allgemeines Unwohlsein, Fieber, abnorme Leberwerte und Gewichtszunahme.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

**5. WIE IST URTIMED 10 mg TABLETTEN AUFZUBEWAHREN?**

**Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.**

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und der Blisterpackung angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats. Bewahren Sie die Blisterpackung im Umkarton auf, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

Das Arzneimittel darf nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr benötigen. Diese Maßnahme hilft die Umwelt zu schützen.

**6. WEITERE INFORMATIONEN**

**Was Urtimed 10 mg Tabletten enthält:**

- Der Wirkstoff ist Rupatadin. Eine Tablette enthält 10 mg Rupatadin (als Fumarat).
- Die sonstigen Bestandteile sind prägelatinierte Maisstärke, mikrokristalline Cellulose, rotes Eisenoxid (E172), gelbes Eisenoxid (E172), Lactose-Monohydrat und Magnesiumstearat (Ph. Eur.).

**Wie Urtimed 10 mg Tabletten aussieht und Inhalt der Packung:**

Urtimed 10 mg Tabletten sind runde, hell-lachsfarbene Tabletten, einzeln abgepackt in Blisterpackungen mit 3, 7, 10, 15, 20, 30, 50 und 100 Tabletten. Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

**Pharmazeutischer Unternehmer**

Biohorm, S.A.  
Av. Camí Reial, 51-57  
E-08184 Palau-solità i Plegamans (Barcelona-Spanien)

**Hersteller**

J. Uriach & Cía., S.A.  
Av. Camí Reial, 51-57  
E-08184 Palau-solità i Plegamans (Barcelona - Spanien)

**Vertrieb**

Dr. R. Pfleger GmbH  
D-96045 Bamberg  
Telefon: 0951/6043-0  
Telefax: 0951/604329  
E-Mail: [info@dr-pfleger.de](mailto:info@dr-pfleger.de)

**Dieses Arzneimittel ist in den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) unter den folgenden Bezeichnungen zugelassen:**

- Italien - Pafinur 10 mg Comprese
- Frankreich - Alergoliber 10 mg Comprimes
- Spanien - Alergoliber 10 mg Comprimidos
- Deutschland - Urtimed 10 mg Tabletten

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Januar 2012.**

204740  
003  
palde-212-20120202